

Проф.В.С.Гуревич

Гиполипидемические и антиатерогенные эффекты аторвастатина при метаболическом синдроме

Кафедра кардиологии СПбГМА им.И.И.Мечникова

**Центр Атеросклероза и нарушений липидного обмена
(Клиническая больница №122 им.Л.Г.Соколова)**

Характеристика дислипидемии при метаболическом синдроме

- Высокие триглицериды
- Высокий уровень свободных жирных кислот
- Низкий холестерин ЛПВП
- Малые плотные ЛПНП
- Высокий уровень гликозилированных и окисленных ЛПНП

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ


- Оценка сосудистого риска (ИБС, диабет 2-го типа)**
 - Интенсивная немедикаментозная терапия**
 - Адекватная гиполипидемическая фармакотерапия**
 - Достижение целевых значений ХС-ЛПНП и триглицеридов**
-

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХС-ЛПНП ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ




В.С.Гуревич 2010


Выбор гиполипидемического препарата в зависимости от типа дислипидемии



Выбор начальной дозы аторвастатина в зависимости от целевых значений ХС-ЛПНП и уровня риска



Частота прекращения лечения из-за побочных эффектов при использовании Аторвастатина в дозировке 10-80мг




В.С.Гуревич 2010

Адаптировано: Newman CB. et al. Am J Cardiol. 2003; 92:670-676. Review of 44 completed clinical trials.

Показания для фармакотерапии при гипертриглицеридемии у пациентов с метаболическим синдромом

- ТГ > 1,7 ммоль/л при ИБС, несмотря на контролируемую нормогликемию и диету
- ТГ > 2,3 мг/дл (для первичной профилактики ИБС при наличии других факторов риска ИБС)
- ТГ > 4,5 ммоль/л в отсутствии др. факторов риска ИБС

CARDS: Первичная профилактика ИБС (10 мг/день аторвастатина) при диабете 2-го типа с нормальным уровнем холестерина



Placebo 1410
Atorva 1428

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТОРВАСТАТИНА У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ :
ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE**
(Хохлов А.Л. И соавт. «Русский Мед.журнал, 2006 г.»)

| Группа наблюдения | До лечения | После лечения |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Аторис | 4.40% | 1.65% |
| Контроль | 3.61% | 2.95 % |

**СПбГМА им. ИИ Мечникова,
Кафедра кардиологии,**

Центр Атеросклероза и нарушений липидного обмена

www.med122.com

Тел.: 559-9759

**Адрес: 194291 Санкт-Петербург,
пр.Луначарского 47,
Клиническая больница № 122
им. Л.Г.Соколова**

